

Düzeltilme-1

Zinn Halkası

Anatomi Ders Notu Sayfa 8’de yer alan “Zinn Halkası” slaytında geçen “Orbitadaki **düz** kaslar Zinn Halkası’ndan orijin alır” ifadesi, “Orbitadaki **çizgili** kaslar Zinn Halkası’ndan orijin alır” olarak düzeltilmiştir.

Zinn Halkası geçen yapılar

- n. opticus
- n. oculomotorius
- n. abducens
- n. nasociliaris
- a. ophthalmica

! orbitadaki ~~düz~~ kaslar zinn halkasından orijin alır.

İstisna: m. obliquus inferior

"M. Obliquus inferior hariç orbitadaki tüm ekstraoküler kaslar Zinn halkasından orijin alırlar. Bu kaslar **çizgili kas** yapısındadır"

Düzeltilme-2

S. Saprophyticus

Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa 16'da yer alan “S. Saprophyticus” slaytında geçen “**fakültatif anaerop üreme özelliği yoktur**” ifadesi, “**fakültatif anaerop üreme özelliği değişkendir**” olarak düzeltilmiştir.

Stafilokoklar genel olarak fakültatif anaerop üreme özelliğine sahiptir. Ancak S. saprophyticus'un da aralarında bulunduğu bazı stafilokok türlerinde anaerobik koşullarda üreme özelliği suşa ya da test koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Referans textbookta, bu özelliğin S. saprophyticus için **değişken derecede** olduğu (%11-89 arası) belirtilmektedir.

S. Saphrophyticus

- KATALAZ(+), KOAGÜLAZ(-)
- NOVOBİYOSİNE duyarlı değildir.
- **fakültatif anaerop üreme özelliği ~~yoktur~~**
- nonkomplike üriner sistem enfeksiyonlarında **e.coli'den sonra** en sık saptanan etkidir.

tusanaliz.net

"**Değişken derecede** fakültatif anaerop üreme özelliği gösterebilir."

Düzeltilme-3

Arbovirüsler

Mikrobiyoloji Ders Notu Sayfa 84 ve 85’te yer alan “**Arbovirüsler**” başlığına sahip slaytların başlığı, ilgili etkenlerin taksonomik sınıflamasını tam ve doğru biçimde yansıtmadığı için “**Arbovirüsler ve Rodent-Borne Virüsler**” olarak düzeltilmiştir.

Arbovirüsler, artropodlarla bulaşan virüsleri tanımlar. Rodent-borne virüsler ise kemirgenlerle bulaşan virüsleri tanımlar. İlgili içeriklerde herhangi bir düzeltme gereksinimi yoktur, yalnızca slayt başlıkları düzeltilmiştir.

Düzeltilme-4

Spontan Regresyon İzlenen Tümörler

Patoloji Ders Notu Sayfa 27’de yer alan “**Spontan Regresyon İzlenen Tümörler**” slaytında geçen “**Wilms Tümörü**”, spontan regresyonun izlendiği tümörlerden biri olmayıp ilgili içerikten **kaldırılmıştır**.

Wilms tümörünün öncül lezyonu kabul edilen nefrojenik kalıntılar (*nephrogenic rests*) **spontan regresyon gösterebilir. Ancak bu lezyonlar malignleşerek Wilms tümörüne dönüştükten sonra spontan regresyon göstermesi beklenmez.**

Spontan Regresyon izlenen tümörler

- NÖROBLASTOM
- ~~WILMS Tümörü~~
- RETİNOBLASTOM
- MALİGN MELANOM
- KORYOKARSİNOM
- HEMANJİOM
- PIYOJENİK GRANÜLOM

Düzeltilme-5

Proteinüri Tipleri

Dahiliye Ders Notu Sayfa 32’de yer alan “**Proteinüri Tipleri**” slaytında, **Fonksiyonel Proteinüri** nedenleri arasında belirtilen “**uzun süre ayakta kalmaya bağlı gelişir**” ifadesi esas olarak ortostatik proteinüriyi tanımlamakta olup ilgili slaytta **Ortostatik Proteinüri başlığı altına taşınmıştır.**

Proteinüri Tipleri

→ Fonksiyonel proteinüri;

- idrar proteini < 2g/gün
- ateş, epilepsi, egzersiz, kalp yetersizliği ve ~~uzun süre ayakta kalma~~ ya bağlı gelişir.

→ ORTOSTATİK proteinüri;

- idrar proteini genelde < 1g/gün
- SABAH idrarında proteinüri saptanmaz.
- TANI için gün boyunca 12 saatte toplanan idrar incelenir.
- Hipertansiyon ya da Hematüri beklenmez.
- Biyopsi gerekmez, prognoz iyidir.

“Uzun süre ayakta kalma ile ilişkili olan **Ortostatik proteinüridir.**”

Dipnot: Referans textbooklarda proteinüri sınıflamasına ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmakta; ortostatik proteinüri bazı kaynaklarda fonksiyonel/geçici proteinüri şemsiyesi altında da değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle, uzun süre ayakta kalmaya bağlı gelişen ortostatik proteinürinin kavramsal olarak fonksiyonel proteinüri kapsamında da ele alınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.